

Conditions d'octroi des subventions : l'ensemble des arbustes doivent provenir de ces listes, dont minimum 2/3 de la liste A, et maximum 1/3 de la liste B.

Espèces	Hauteur moyenne (m)	Persistants	Epineux	Exigence en lumière	Gradient hydrique du sol	Fruits	Intérêts paysagers	Intérêts écologiques	Recépage possible
---------	---------------------	-------------	---------	---------------------	--------------------------	--------	--------------------	----------------------	-------------------

LISTE A

Amélanchier <i>Amelanchier ovalis</i>	3				Sec à très sec		Fleurs blanches ; couleur automnale		
Argousier <i>Hippophae rhamnoides</i>	4		x		Large amplitude		Feuilles argentées ; baies oranges		
Aubépine épineuse <i>Crataegus laevigata</i>	5		x		Bien drainé à drainage moyen		Fleurs blanches		
Aubépine monogyne <i>Crataegus monogyna</i>	5		x		Large amplitude		Fleurs blanches		
Bois de Sainte-Lucie <i>Prunus mahaleb</i>	4				Sec à très sec		Fleurs blanches parfumées		x
Bourdaine <i>Frangula alnus</i>	4				Drainage moyen à plutôt humide		Floraison décorative		
Charme <i>Carpinus betulus</i>	25				Large amplitude		Feuillage marcescent		x
Chèvrefeuille des haies <i>Lonicera xylosteum</i>	4				Bien drainé à drainage moyen		Fleurs blanches et jaunes, parfumées		
Clématite des haies <i>Clematis vitalba</i>	6				Large amplitude		Fleurs blanches et fruits décoratifs		
Cornouiller mâle <i>Cornus mas</i>	7				Sec à très sec		Fleurs jaunes		
Cornouiller sanguin <i>Cornus sanguinea</i>	4				Large amplitude		Tiges rouges		x
Cytise faux-ébénier <i>Laburnum anagyroides</i>	8				Sec à très sec		Inflorescences jaunes en grappes		
Eglantier <i>Rosa canina</i>	3		x		Sec à très sec		Fleurs roses, parfumées		
Epine noire <i>Prunus spinosa</i>	3		x		Sec à très sec		Fleurs blanches		
Epine-vinette <i>Berberis vulgaris</i>	3		x		Sec à très sec		Fleurs jaunes décoratives		
Erable champêtre <i>Acer campestre</i>	15				Bien drainé à drainage moyen		Feuilles rouges en automne		x
Fusain <i>Evonymus europaeus</i>	6				Bien drainé à drainage moyen		Fruits rose-orange ; couleur automnale		x
Groseillier épineux <i>Ribes uva-crispa</i>	2		x		Bien drainé à drainage moyen		Petites fleurs blanches		
Houx <i>Ilex aquifolium</i>	8	x	x		Drainage moyen à plutôt humide		Feuilles brillantes et persistantes		
If <i>Taxus bacata</i>	9	x			Bien drainé à drainage moyen		Feuilles persistantes		x
Merisier <i>Prunus avium</i>	15				Drainage moyen à plutôt humide		Floraison décorative		

Subvention – Haie vive

Nerprun purgatif <i>Rhamnus cathartica</i>	4				Bien drainé à drainage moyen		Fleurs vertes		
Noisetier <i>Corylus avellana</i>	6				Bien drainé à drainage moyen		Floraison précoce : chatons ; noisettes		x
Saule marsault <i>Salix caprea</i>	10				Drainage moyen à plutôt humide		Chatons duveteux		x
Saule pourpre <i>Salix purpurea</i>	10				Large amplitude		Chatons duveteux		x
Sureau noir <i>Sambucus nigra</i>	8				Drainage moyen à plutôt humide		Fleurs blanches		x
Troène <i>Ligustrum vulgare</i>	5	x			Large amplitude		Fleurs blanches		x
Viorne lantane <i>Viburnum lantana</i>	4				Sec à très sec		Fleurs blanches ; couleur automnale		x
Viorne obier <i>Viburnum opulus</i>	5				Drainage moyen à plutôt humide		Floraison blanche décorative		x

Légende

Exigences en lumière	
Ombre	
Lumière/mi-ombre	
Lumière	

Fruits	
Comestibles	
Toxiques	

Intérêts écologiques	
Refuge pour la faune	
Fleurs mellifères	
Graines	
Fruits	

Espèces	Hauteur moyenne (m)	Persistants	Epineux	Exigence en lumière	Gradient hydrique du sol	Fruits	Intérêts paysagers	Intérêts écologiques	Récupage possible
---------	---------------------	-------------	---------	---------------------	--------------------------	--------	--------------------	----------------------	-------------------

LISTE B

Pommier d'ornement <i>Malus sylvestris</i>	6				frais, humide, riche	Pas très bon mais comestible	dépend de la variété blanc ou rose ou pourpre. Petites pommes décoratives	mélifère	
Prunier d'ornement <i>Prunus x subhirtella 'Autumnalis Rosea'</i>	5				frais, humide, riche		floraison rose tendre octobre à décembre	mélifère	
Epine-vinette <i>Berberis thunbergii "Atropurpurea"</i>	1		x	 	frais, humide, riche		feuillage rouge	nourriture habitat	
Mahonie <i>Mahonia aquifolium</i>	2	x		 	frais, humide, acide à neutre	comestible	fleurs jaunes	mélifère nourriture habitat	
Abélia <i>Abelia x grandiflora</i>	1.5	x		 	frais, faiblement acide		floraison		
Callicarpe <i>Callicarpa x bodinieri</i>	2			 	frais, humide, acide à neutre			fruits en octobre	
Calycanthe <i>Calycanthus floridus</i>	2			 	frais, humide, acide à neutre		floraison		
Caryopteris x clandonensis	1				sec, frais, calcicole		floraison août-septembre	mélifère	x
Céanothe <i>Ceanothus x delilianus</i>	1.5				sec, frais, calcicole		floraison juillet-août		
Chimonanthe <i>Chimonanthus praecox</i>	2.5				frais, faiblement acide à alcalin		floraison, odorat en février		
Cornouiller blanc <i>Cornus alba 'Elegantissima'</i>	2			 	frais, humide, riche		feuillage panaché blanc		x
Cornouiller <i>Cornus alba 'Sibirica'</i>	2			 	frais, humide, riche		bois rouge		x
Cornouiller <i>Cornus alba 'Spaethii'</i>	2			 	frais, humide, riche		feuillage panaché jaune		x
Arbre à perruque <i>Cotinus coggygria</i>	2.5			 	sec, frais, calcicole		feuillage vert		
Arbre à perruque <i>Cotinus coggygria 'Royal Purple'</i>	2.5				sec, frais, calcicole		feuillage rouge		
Deutzia x hybrida 'Mont Rose'	1.5			 	frais, humide, riche		floraison blanche en juin		
Deutzia x magnifica	2.5			 	frais, humide, riche		floraison blanche en juin		
Forsythia x intermedia	3				frais, humide, riche		floraison jaune en avril		x
Althéa <i>Hibiscus</i>	2				frais, humide		floraison août-septembre		
Kolkwitzia amabilis	2				frais, humide		rose clair en juin		

Subvention – Haie vive

Osmanthe <i>Osmanthus x burkwoodii</i>	2	x		frais faiblement acide à alcalin		fleurs blanches parfumées avril-mai		
Pérovskie <i>Perovskia 'Blue Spire'</i>	1			sec, frais, calcicole		floraison bleu-violet août-septembre	mélifère	x
Citronnelle <i>Philadelphus coronarius</i>	3			frais		fleurs blanc-crème mai-juin		
Citronnelle <i>Philadelphus 'Belle Etoile'</i>	1.5			frais, humide, riche		floraison blanche, gorge pourpre, cœur jaune en juin		
Groseiller à grappes <i>Ribes sanguineum</i>	2			frais, humide		floraison rouge lumineux avril-mai		
Sorbier des oiseaux <i>Sorbus aucuparia</i>	12			frais		floraison blanc-crème en mai-juin	Fructification et nourriture pour les oiseaux	
Spirée <i>Spiraea nipponica 'Snowmound'</i>	1.5			frais, humide		Floraison blanche en mai-juin		
Spirée <i>Spiraea x vanhouttei</i>	2.5			frais, humide, riche		Floraison blanche parfumée en avril-mai		
Lilas <i>Syringa</i>	2.5			frais, faiblement acide à alcalin		dépend de la variété blanc ou rose ou pourpre.		
Viorne <i>Viburnum tinus</i>	2.5	x		sec, frais calcicole		Floraison rose clair à blanc de novembre à avril		
Weigela florida 'Variegata'	1.5			frais, humide, riche		Floraison blanc-jaunâtre en mai-juin		
Weigela florida 'Victoria'	1.2			frais, humide, riche		Floraison rose en mai-juin		
Weigela 'Bristol Ruby'	2.5			frais, humide, riche		Floraison rouge foncé mai à juillet		
Weigela 'Rosabella'	2.5			frais, humide, riche		Floraison rose en mai-juin		